

International Index of Erectile Function - Questionario IIEF

Queste domande riguardano l'effetto che i suoi problemi di erezione hanno avuto sulla sua vita sessuale **nelle ultime 4 settimane**. La preghiamo di rispondere a queste domande nel modo più sincero e chiaro possibile. Risponda a ogni domanda facendo un segno [√] su **una** delle caselle. Se è incerto su come rispondere la preghiamo di dare la risposta che ritiene migliore.

Nel rispondere a queste domande vanno tenute presenti le seguenti definizioni:

* **Rapporto sessuale**

Viene definito come la penetrazione (introduzione del pene) vaginale della partner.

** **Attività sessuale**

Include rapporti sessuali, accarezzamenti, preliminari e masturbazione.

*** **Eiaculazione**

Viene definita come l'emissione di sperma dal pene (o la sensazione che ciò avvenga).

**** **Stimolazione sessuale** Include situazioni come giochi erotici con una partner, guardare immagini erotiche, ecc.

1. Nelle ultime 4 settimane quanto spesso è stato in grado di avere un'erezione durante l'attività sessuale** ?

- [0] Non ho avuto nessuna attività sessuale
- [1] Quasi mai o mai
- [2] Poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [3] Qualche volta (circa la metà delle volte)
- [4] La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [5] Quasi sempre o sempre

2. Nelle ultime 4 settimane quando ha avuto delle erezioni in seguito a stimolazione sessuale****, quanto spesso queste erano tali da permettere la penetrazione?

- [0] Non ho avuto nessuna attività sessuale
- [1] Quasi mai o mai
- [2] Poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [3] Qualche volta (circa la metà delle volte)
- [4] La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [5] Quasi sempre o sempre

Le prossime 3 domande riguardano le erezioni che lei può avere avuto durante il rapporto sessuale*.

3. Nelle ultime 4 settimane quando ha tentato di avere un rapporto sessuale, quanto spesso è stato in grado di penetrare la sua partner ?

- [0] Non ho avuto nessuna attività sessuale
- [1] Quasi mai o mai
- [2] Poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [3] Qualche volta (circa la metà delle volte)
- [4] La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [5] Quasi sempre o sempre

4. Nelle ultime 4 settimane durante un rapporto sessuale* quanto spesso è stato in grado di mantenere l'erezione dopo aver penetrato la sua partner ?

- [0] Non ho avuto nessuna attività sessuale
- [1] Quasi mai o mai
- [2] Poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [3] Qualche volta (circa la metà delle volte)
- [4] La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [5] Quasi sempre o sempre

5. Nelle ultime 4 settimane durante il rapporto sessuale* quanto difficile è stato mantenere la sua erezione fino al completamento del rapporto ?

- [0] Non ho tentato di avere rapporti sessuali
- [1] Estremamente difficile
- [2] Molto difficile
- [3] Difficile
- [4] Poco difficile
- [5] Per niente difficile

15. Nelle ultime 4 settimane come valuterebbe il suo livello di fiducia nel poter raggiungere e mantenere un'erezione?

- [1] Molto basso
- [2] Basso
- [3] Moderato
- [4] Alto
- [5] Molto alto

Referenze: Rosen RC, Riley A, Wagner G et al.: The International Index of Erectile Function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology 1997; 49 (6): 822-830

Grado di severità della DE
Domande 1 – 5 & 15 (al massimo 30 punti)

Disturbi gravi	1-10
Disturbi moderati	11-16
Disturbi leggeri	17-25
Normale (nessuna DE)	26-30